



## Guía del Paciente para Tomar Medicamento para TB

### ¿Qué es Etambutol?

Etambutol (EMB) es un medicamento antibiótico utilizado para tratar la tuberculosis (TB) (cuando es tomado con otros medicamentos)

Los gérmenes TB son muy fuertes y difíciles de matar. Usted tendrá que tomar este medicamento por dos meses o más en orden de matar la bacteria de la TB. Su médico decidirá exactamente cuantos meses tendrá que tomar este medicamento.

### ¿Cómo tomo este medicamento?

- Es muy importante que usted tome el medicamento cada día o según le indique su médico.
- Informe a su médico inmediatamente si deja de tomar la medicina.
- Si usted falla una dosis, tómela cuanto antes, pero nunca tome dos dosis al mismo tiempo.
- Puede tomar este medicamento con o sin comida.
- Almacene EMB en un lugar fresco y seco.
- Recuerde decirle a su médico acerca de otros medicamentos que esté tomando o cualquier nuevo medicamento que empiece a tomar.

**\*Este medicamento puede ser tomado una o dos veces dependiendo lo que ha recetado su doctor.**

**\*Si está embarazada o amamantando, hable con su doctor antes de tomar este medicamento.**

### ¿Cuáles son algunos de los efectos secundarios a los que debo estar atento?

· Usted tendrá que ser monitoreado regularmente por su médico mientras está tomando Etambutol.

#### • Algunos efectos secundarios comunes son::

- ◇ Pérdida de apetito
- ◇ Dolor estomacal
- ◇ Sarpullido Cutáneo

#### • Si tiene alguno de los siguientes efectos secundarios más graves, deje de tomar el medicamento y llame a su médico.

- ◇ EMB puede provocar cambios en cómo ve en uno o ambos ojos. Si usted tiene visión borrosa o cambios en cómo ve colores, llame a su médico tan pronto como sea posible.
- ◇ Si usted toma este medicamento por más de dos meses, necesitara tener sus ojos revisados.

### Consejos para tomar su medicamento de TB

- Tome su medicamento al mismo tiempo cada día, por ejemplo:
  - Antes de ir a la cama
  - Primera cosa por la mañana
- Use un contenedor de píldoras semanal
- Marque cada día después de tomar sus píldoras
- Pídale a un familiar o un amigo que se lo recuerde
- Considere la Terapia de Observación Directa (DOT por sus iniciales en español)

Adaptado y Reimprimido Con El Permiso de Salud Pública de Toronto